

Kapitel 2: Graphentheorie

Inhalt:


2.1 Grundlagen

2.2 Das Königsberger Brückenproblem

2.3 Bäume

2.4 Planare Graphen



2.5 Färbungen




2.1 Grundlagen

Ein **Graph** besteht aus **Ecken** und **Kanten**; dabei **verbindet jede Kante genau zwei Ecken**; je zwei Ecken können durch keine, eine oder mehr als eine Kante verbunden sein.

Beispiele:






Anwendungen

Städteverbindungen: Ecken = Städte, Kanten = Straßen.
Typische (und schwere) Frage: Wie kann man eine Rundreise kürzester Länge finden? (“**Travelling Salesman Problem**“).

Chemische Moleküle: Ecken = Atome, Kanten = Verbindungen.
Wichtige Frage (die zur Entwicklung der Graphentheorie entscheidend beigetragen hat): Gegeben eine Summenformel (z.B. $C_nH_{2n+1}OH$), wie viele verschiedene Strukturformeln gibt es dazu?

Soziogramme: Ecken = Personen einer Gruppe, Kanten = Beziehungen zwischen den Menschen (z.B. „bekannt sein mit“).




Vollständige Graphen


Ein Graph heißt **vollständig**, wenn **jede Ecke mit jeder anderen durch genau eine Kante verbunden** ist.

Das heißt, bei einem vollständigen Graphen sind je zwei Ecken verbunden, aber nur durch eine Kante.

Der vollständige Graph mit n Ecken wird mit K_n bezeichnet.

Beispiele:






Zusammenhängende Graphen


Ein Graph heißt **zusammenhängend**, wenn man **von jeder Ecke zu jeder anderen über eine Folge von Kanten** kommen kann.

Das bedeutet: Ein Graph ist zusammenhängend, wenn er nicht in mehrere Teile “zerfällt”.


Beispiel:



zusammenhängend



unzusammenhängend



Grad einer Ecke


Der **Grad einer Ecke** ist die **Anzahl der Kanten, die von dieser Ecke ausgehen**.


Beispiele:

a) Der Grad einer Ecke ist gleich 0, falls von ihr keine Kante ausgeht.

b) In dem vollständigen Graphen K_n hat jede Ecke den Grad $n-1$, da sie mit jeder der $n-1$ anderen durch genau eine Kante verbunden ist.

Im allgemeinen haben die Ecken eines Graphen verschiedene Grade. **Beispiel:**






2.2 Das Königsberger Brückenproblem


Dem Mathematiker **Leonhard Euler** wurde 1736 folgendes Problem gestellt, das ihn zur **Entwicklung der Graphentheorie** geführt hat.

Durch Königsberg fließt die Pregel, die sich teilt und zwei Inseln umfließt.

Diese sind untereinander und mit den Ufern wie abgebildet durch Brücken verbunden.



Schwierige Frage: Gibt es einen Spaziergang, der jede Brücke genau einmal überquert und bei dem man zum Ausgangspunkt zurückkehrt?







Übersetzung der Karte in einen Graphen

Jedem **Landteil** wird eine **Ecke** zugeordnet: ●

Jede **Brücke** wird mit einer **Kante** identifiziert: /


Aus der **Landkarte** erhält man so den folgenden **Graphen**:






Übersetzung des Problems (I): Eulersche Kreise

Sei G ein Graph. Eine **Folge** k_1, k_2, \dots, k_s von Kanten von G heißt **Kantenzug**, falls es Ecken e_0, e_1, \dots, e_s gibt, so daß die Kante k_1 die Ecken e_0 und e_1 verbindet, die Kante k_2 die Ecken e_1 und e_2 verbindet, ..., die Kante k_s die Ecken e_{s-1} und e_s verbindet.



Ein Kantenzug heißt ein **eulerscher Kreis** von G , wenn

- **jede Kante** von G **genau einmal** unter den k_1, k_2, \dots, k_s auftaucht
- und $e_s = e_0$ ist.




Übersetzung des Problems (II): Eulersche Graphen


Ein **eulerscher Graph** ist ein Graph, der einen **eulerschen Kreis** enthält.

Mit anderen Worten: Ein Graph ist **eulersch**, wenn man

- seine Kanten **in einem Zug zeichnen** kann und
- am Ende wieder **am Ausgangspunkt** anlangt.

Beispiel: K_5 ist eulersch:





Lösung des Königsberger Brückenproblems


Der gesuchte Spaziergang, der jede Brücke genau einmal überquert und zum Startpunkt zurückkehrt, entspricht einem eulerschen Kreis. Unsere **Frage** lautet also: **Ist der Graph des Königsberger Brückenproblems eulersch?**

Eine **Antwort** gibt der

Satz von Euler (1736): Wenn ein Graph G eulersch ist, dann hat jede Ecke von G geraden Grad.



Damit gelang Euler die **Lösung des Königsberger Brückenproblems**: Der Graph des Problems hat Ecken vom Grad 3, 3, 3, 5. Also ist er **nicht eulersch**. **Ein solcher Spaziergang ist nicht möglich!**




Beweis des Satzes von Euler

Sei e eine beliebige Ecke von G . Der eulersche Kreis durchquert die Ecke e ein paar Mal, sagen wir a mal.

Behauptung: Der Grad der Ecke e ist gleich $2a$, also eine gerade Zahl.

Denn: Bei jedem Durchgang durch e verbraucht der eulersche Kreis zwei Kanten; in a Durchgängen werden also $2a$ Kanten erfaßt. Da keine Kante zweimal benutzt werden darf, ist der Grad von e also mindestens gleich $2a$. Der Grad kann aber auch nicht größer sein, da jede Kante (also auch jede Kante, die an e angrenzt) in dem eulerschen Kreis mindestens einmal vorkommen muß.

Damit ist der Grad von e wirklich gleich $2a$, und der Satz ist bewiesen.




Umkehrung des Satzes von Euler

Mitteilung (ohne Beweis): Es gilt auch die

Umkehrung des Satzes von Euler: Wenn in einem zusammenhängenden Graphen G jede Ecke geraden Grad hat, dann ist G eulersch.

Folgerung: Jeder vollständige Graph K_n mit ungeradem n (also K_3 , K_5 , K_7 , ...) ist eulersch.


Denn: Jede Ecke von K_n hat den Grad $n-1$; und wenn n ungerade ist, ist $n-1$ gerade.




Offene eulersche Linien

Eine **offene eulersche Linie** ist ein Kantenzug,
- der **jede Kante genau einmal durchquert**,
- wobei die **Anfangsecke verschieden von der Endecke** ist.

Also kann ein Graph genau dann **“in einem Zug”**
gezeichnet werden, wenn er einen eulerschen
Kreis oder eine offene eulersche Linie besitzt. **Beispiel:**



Satz: Ein zusammenhängender Graph besitzt genau dann eine offene eulersche Linie, wenn er genau 2 Ecken ungeraden Grades besitzt.
Wenn dies der Fall ist, so beginnt die offene eulersche Linie an der einen Ecke ungeraden Grades und endet an der anderen.



Beweis der Hinrichtung


Wir müssen zwei Richtungen zeigen.

1. Richtung: “Wenn G eine offene eulersche Linie hat, dann gibt es genau 2 Ecken mit ungeradem Grad.”

G habe eine offene eulersche Linie mit Anfangsecke a und Endecke e .

Trick: Wir denken uns eine **zusätzliche Kante k^*** zwischen a und e . Dann wird aus der offenen eulerschen Linie eine geschlossene. Nach dem Satz von Euler hat dann also jede Ecke geraden Grad.

Nun vergessen wir k^* wieder. Jede Ecke verschieden von a und e hat dann immer noch geraden Grad, während sich der Grad von a und e jeweils um 1 erniedrigt hat, also jetzt ungerade ist. Also sind a und e die einzigen Ecken ungeraden Grades.




Beweis der Rückrichtung

2. Richtung: “Wenn G genau 2 Ecken mit ungeradem Grad hat, dann gibt es eine offene eulersche Linie.”

Sei G ein zusammenhängender Graph, der genau zwei Ecken a und e ungeraden Grades besitzt.


Trick: Wir denken uns eine **zusätzliche Kante k^*** zwischen a und e . Diese hat den Effekt, daß jetzt jede Ecke geraden Grad hat. Nach der Umkehrung des Satzes von Euler hat der Graph mit der Kante k^* eine geschlossene eulersche Linie.

Wenn wir k^* wieder vergessen, wird aus der geschlossenen eulerschen Linie eine offene mit der Anfangsecke a und der Endecke e . Also hat G eine offene eulersche Linie.




Bsp.: Gibt es „offene Spaziergänge“ durch Königsberg?

Der Graph des Königsberger Brückenproblems hat **vier Ecken ungeraden Grades**.



Also enthält er auch **keine offene Linie**.


Es gibt also keinen Spaziergang durch Königsberg, der jede Brücke genau einmal überquert – selbst wenn der Startpunkt verschieden vom Endpunkt sein darf.




2.3 Bäume

Ein **Baum** ist ein Graph, der **zusammenhängend** ist und **keinen Kreis enthält**.

Beispiel: Alle Bäume mit höchstens fünf Ecken:



Bemerkung: Wir betrachten nur Bäume mit **endlich vielen Ecken**.




Hilfssatz über Endecken

Eine **Endecke** eines Baums ist eine Ecke vom **Grad 1**.

Hilfssatz. Jeder Baum (bis auf den Baum, der nur aus einer Ecke besteht) hat mindestens eine Endecke.

Beweis: Wir starten mit einer beliebigen Ecke e_0 . Wir gehen von e_0 aus über eine Kante zu einer Ecke e_1 . Wenn e_1 eine Endecke ist, so ist alles gut. Wenn nicht, können wir über eine neue Kante von e_1 aus zu einer Ecke e_2 gelangen. Wenn e_2 eine Endecke ist, sind wir fertig. Sonst gehen wir über eine neue Kante zu einer Ecke e_3 . Usw. Alle diese Ecken sind verschieden (sonst gäbe es einen Kreis). Da es nur endlich viele Ecken gibt, muß obige Konstruktion einmal abbrechen. Die Ecke, an der es nicht weitergeht, ist eine Endecke.



Satz über die Anzahl von Ecken und Kanten


Satz: Für jeden Baum G mit n Ecken und m Kanten gilt $n = m + 1$.

Beweis durch “**Induktion**” nach der Anzahl n der Ecken:

“**Induktionsverankerung**”: Im Fall $n = 1$ besteht G nur aus einer Ecke und keiner Kante; also ist $m = 0$, und somit $n = m + 1$.

“**Induktionsvoraussetzung**”: Angenommen, die Behauptung gilt bis zu einem gewissen n . Daraus müssen wir die Gültigkeit für $n + 1$ folgern.

“**Induktionsschritt**”: Sei G ein Baum mit $n + 1$ Ecken. Nach dem Hilfssatz hat G eine Edecke e^* . Entfernen wir e^* und die an e^* angrenzende Kante k^* , so erhalten wir einen Baum G^* mit nur n Ecken. Nach Induktionsvoraussetzung hat G^* also genau $n - 1$ Kanten. Da G genau eine Kante mehr als G^* hat, hat G genau n Kanten. Damit ist der Induktionsschritt bewiesen, die Aussage gilt allgemein.




2.4 Planare Graphen



Ein Graph heißt **planar**, falls er “ohne Überschneidungen” in der Ebene gezeichnet **ist**.


Beispiele:

(a)



(b) Projektionen konvexer Polyeder, z.B. eines Würfels:






Plättbare Graphen


Ein Graph ist **plättbar**, wenn er **überschneidungsfrei** in die Ebene **gezeichnet werden kann**.

Beispiel:


Der Graph



ist plättbar, denn er kann wie folgt
überschneidungsfrei gezeichnet werden:



Ein Graph heißt **einfach**, wenn **je zwei Ecken durch höchstens eine Kante verbunden** sind.



Die Eulersche Polyederformel


Jeder planare Graph zerlegt die Ebene in **Gebiete**.

Wir bezeichnen die **Anzahl der Gebiete** mit g .

Es gibt stets mindestens ein Gebiet, das **äußere Gebiet**. D.h.: $g \geq 1$.

Beispiele:

(a) Der Graph




hat $g = 6$.

(b) Bäume haben $g = 1$.

Eulersche Polyederformel. Sei G ein zusammenhängender planarer Graph mit n Ecken, m Kanten und g Gebieten. Dann gilt:

$$n - m + g = 2.$$



Beweis der Eulerschen Polyederformel


Beweis durch **Induktion** nach der Anzahl g der Gebiete.

Induktionsverankerung: Sei zunächst $g = 1$. Dann hat G keine Kreise, ist also ein Baum. Daher gilt nach dem letzten Satz $n = m+1$, das heißt $n - m + g = (m+1) - m + 1 = 2$.

Induktionsvoraussetzung: Angenommen, die Aussage gilt für ein g .
Zu zeigen: sie gilt auch für $g+1$.

Induktionsschritt: G habe $g+1$ Gebiete. Da $g+1 > 1$ ist, ist G kein Baum, enthält daher einen Kreis. Wir entfernen eine Kante k^* dieses Kreises. Da k^* an zwei Gebiete von G angrenzt, hat der neue Graph G^* nur noch $g^* = g$ Gebiete. Also können wir auf G^* die Induktionsvoraussetzung anwenden (G^* hat $m-1$ Kanten und n Ecken):

$2 = n - (m-1) + g = n - m + (g+1)$. Also gilt die Aussage für $g+1$.



Satz über planare Graphen


Satz: Sei G ein zusammenhängender einfacher planarer Graph mit $n \geq 3$ Ecken und m Kanten. Dann gilt: $m \leq 3n - 6$.
(D.h.: Ein planarer Graph hat relativ wenige Kanten.)

Beweis (durch trickreiche Abzählungen):

Für ein Gebiet L (wie "Land") sei $m(L)$ die Anzahl der Kanten dieses Landes. Da jedes Land mindestens drei Kanten hat, gilt: $\sum_{L \text{ Gebiet}} m(L) \geq 3g$.

Nun zählen wir die Paare (k, L) , wobei die Kante k ein Teil der Grenze des Gebiets L ist: $\sum_{L \text{ Gebiet}} m(L) \leq 2m$.

Zusammen folgt: $2m \geq 3g$, d.h. $g \leq 2m/3$. Einsetzen in die Eulersche Polyederformel: $n - m + 2m/3 \geq n - m + g = 2$, also $m \leq 3n - 6$.



Folgerungen

Folgerung: Der vollständige Graph K_5 ist nicht plättbar.


Beweis: Wäre K_5 plättbar, so könnte nach obigem Satz seine Anzahl von Kanten höchstens $3n-6 = 9$ sein. K_5 hat jedoch $\binom{5}{2} = 10$ Kanten.

Satz: Sei G ein zusammenhängender einfacher planarer Graph. Dann gibt es mindestens eine Ecke, die einen Grad ≤ 5 hat.

Beweis: Die Behauptung ist klar für $n = 1$ und $n = 2$. Sei nun $n \geq 3$:
Wenn jede Ecke mindestens den Grad 6 hätte, folgte aus dem vorigen Satz

$$6 \cdot n \leq \sum_{x \text{ Ecke}} \text{Grad}(x) = 2m \leq 6n - 12,$$


das ist ein Widerspruch.




Anwendungsaufgabe

Aufgabe: Drei Häuser A, B, C sollen jeweils durch eine Leitung mit dem Gaswerk (G), Elektrizitätswerk (E) und dem Wasserwerk (W) verbunden werden. Kann man dies so machen, daß sich die Leitungen nicht überkreuzen?

Graphentheoretische Formulierung: Ist der folgende Graph plättbar?



Dieser Graph heißt „vollständig bipartit“ und wird mit $K_{3,3}$ bezeichnet.



Lösung der Aufgabe


Es ist nicht möglich!

Beweis: Angenommen, wir könnten diesen Graphen als planaren Graphen zeichnen. Dann hätte dieser $n = 6$ Ecken, $m = 9$ Kanten, und nach der Eulerschen Polyederformel könnten wir die Anzahl der Länder ausrechnen: $2 = n - m + g = 6 - 9 + g$, also $g = 5$.

Jedes Gebiet des Graphen muß eine gerade Anzahl von Ecken haben, denn Häuser und Versorgungswerke wechseln sich ab. Daher hat jedes Gebiet mindestens 4 Ecken und also auch mindestens 4 Kanten. Daher gilt

und daher $\sum_{L \in \mathcal{L}} m(L) \geq 4g$. In unserem Fall bedeutet dies $18 = 2m \geq 4g = 20$.

Dieser Widerspruch zeigt, daß $K_{3,3}$ nicht plättbar ist.





2.5 Färbungen

Ursprung: Mitte des letzten Jahrhunderts kam die **Frage** auf:

Wie viele Farben braucht man mindestens, um eine beliebige Landkarte so zu färben, daß je zwei benachbarte Länder verschiedene Farben haben?

Vierfarbenvermutung:
Vier Farben genügen!






Vierfarbenvermutung - Die Anfänge

1852: Mathematikstudent **F. Guthrie** färbt Karte von England mit Grafschaften und äußert zum ersten Mal die Vierfarbenvermutung.

Sein Bruder erzählte es seinem Professor **A. de Morgan**, der seinem Kollegen **W. R. Hamilton** in einem Brief davon berichtet.

Hamilton interessierte sich jedoch nicht sehr dafür.





Vierfarbenvermutung - Beweisversuche


1878: “On the colouring of maps” von **A. Cayley**.

1879: “On the geographical problem of the four colors” von **A. B. Kempe**: erster „Beweis“ des Vierfarbensatzes.

1890: **P. J. Heawood** entdeckt einen **Fehler in Kempes Beweis**.

Heawood kann den **Fünffarbensatz** zeigen („5 Farben reichen auf jeden Fall“).

H. Heesch (1906-1995): Entwickelt von Kempes Methoden jahrzehntelang subtil weiter und kommt zu dem Schluß, daß das Problem **mit Hilfe eines Rechners lösbar** sein müßte. Sein Antrag an die DFG wird aber abgelehnt!



Der Beweis des Vierfarbensatzes mit dem Computer


1976: **K. Appel** und **W. Haken** (University of Illinois at Urbana) bauen auf den Arbeiten von Heesch auf, haben Geld für einen Computer und können das Problem lösen.

Der Satz ist endlich bewiesen!



Der Beweis hat viel Aufsehen erregt: Zum ersten Mal beim Beweis eines Satzes wurde der **Computer essentiell eingesetzt**.

Auch heute noch wünschen sich viele Mathematiker einen schönen, kurzen Beweis, den man z.B. in einer Vorlesung darstellen könnte.




Übersetzung der Landkarte in einen Graphen


Wir zeichnen in jedem Land einen **Punkt** (die “**Hauptstadt**”) aus; das sind die **Ecken** des Graphen.

Wir verbinden zwei Ecken durch eine **Kante**, wenn die entsprechenden Länder ein Stück **Grenze** gemeinsam haben.

Auf diese Weise erhält man einen **planaren Graphen**.

Beispiel:





Die chromatische Zahl $\chi(G)$

Eine **Färbung** eines Graphen ist eine Zuordnung von “Farben” zu den Ecken, so daß keine zwei durch eine Kante verbundenen Ecken die gleiche Farbe haben.

Die **chromatische Zahl** $\chi(G)$ eines Graphen G ist die kleinste natürliche Zahl n , so daß G mit n Farben gefärbt werden kann.

(χ ist der griech. Buchstabe “chi”, der Anfangsbuchstabe des Wortes “chroma” = Farbe.)

Beispiele:

(a) Kreise gerader Länge haben $\chi = 2$, Kreise ungerader Länge $\chi = 3$.

(b) $\chi(K_n) = n$.







Übersetzung des Färbungsproblems in Graphentheorie

Übersetzung des Problems: Die Ecken des Graphen sollen so gefärbt werden, daß je zwei durch eine Kante verbundene Ecken verschiedene Farben haben. **Wieviele Farben benötigt eine solche Färbung?**

Die **Vierfarbenvermutung** lautet nun: **Wenn G ein planarer Graph ist, so ist $\chi(G) \leq 4$.**

Folgendes **Beispiel** zeigt, daß nur 3 Farben nicht genügen:






Greedy Algorithmus

Sei $\Delta(G)$ („delta“) der **maximale Grad** von G .

Satz: Für jeden Graphen G (nicht nur für planare) gilt $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

Beweis: Mit folgendem Verfahren („**Greedy Algorithmus**“) kann man einen beliebigen Graphen G mit höchstens $\Delta(G) + 1$ Farben färben: Die Farben seien die Zahlen $1, 2, 3, 4, \dots$. Die Ecken seien numeriert: e_1, e_2, e_3, \dots . Wir färben e_1 mit der Farbe 1 . Wenn wir zu irgendeiner Ecke e_i kommen, färben wir sie mit der kleinsten Farbe, die nicht verboten ist. Wieviel Farben sind für e_i verboten? Schlimmstenfalls ist e_i eine Ecke mit maximalem Grad $\Delta = \Delta(G)$ und alle Δ Nachbarecken von e_i sind bereits verschieden gefärbt. In diesem Fall sind Δ Farben verboten. Dann gibt es aber immer noch eine, die wir wählen können.



Der Vierfarbensatz und der Fünffarbensatz

Für **planare Graphen** gilt etwas viel besseres:


Vierfarbensatz: Jeder planare Graph kann mit vier Farben gefärbt werden. D.h.: Für jeden planaren Graphen G gilt: $\chi(G) \leq 4$.

Das bedeutet: In jeder ebenen Landkarte können die Länder so mit vier Farben gefärbt werden, daß je zwei Länder, die ein Stück gemeinsame Grenze haben, verschieden gefärbt sind.

Der **Beweis** (Apel und Haken, 1976) **ist zu schwierig** für eine Vorlesung.

Wir beweisen den **Fünffarbensatz** (Heawood, 1890):

Jeder planare Graph kann mit fünf Farben gefärbt werden.



Beweis des Fünffarbensatzes (I)


Beweis: Wir gehen schrittweise vor (“Induktion” nach der Eckenzahl n):

Für $n = 1, 2, 3, 4, 5$ ist die Aussage **trivial**: Jeder Graph mit höchstens 5 Ecken kann natürlich mit 5 Farben gefärbt werden.

Sei nun $n \geq 5$, und sei die Aussage **richtig für n** . Das bedeutet: Jeder planare Graph mit n Ecken kann mit 5 Farben gefärbt werden.

Sei nun G ein planarer Graph mit $n+1$ Ecken. Wir müssen zeigen, daß auch G mit 5 Farben gefärbt werden kann.

Wir wissen (Folie 26), daß G eine Ecke e^* vom Grad ≤ 5 enthält. Wir entfernen e^* und alle an e^* anliegenden Kanten. So erhalten wir einen planaren Graphen G^* mit nur n Ecken. Nach Induktionsvoraussetzung besitzt G^* eine Färbung mit 5 Farben.




Beweis des Fünffarbensatzes (II)

Ziel: Mit dieser Färbung von G^* eine Färbung von G erstellen!

1. Fall: Wenn die (≤ 5) zu e^* benachbarten Ecken insgesamt mit höchstens 4 Farben gefärbt sind, dann kann e^* mit der verbleibenden 5. Farbe gefärbt werden.


2. Fall: e^* hat 5 Nachbarecken e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 , die mit den Farben **1, 2, 3, 4, 5** gefärbt sind.

Die Ecken e_1, \dots, e_5 seien gegen den Uhrzeigersinn angeordnet. Wir betrachten zunächst nur die Menge aller Ecken der Farben **1** oder **3**, die von e_1 aus erreichbar sind. Wir unterscheiden zwei (Unter-) Fälle.



Beweis des Fünffarbensatzes (III)

Guter Fall: Wenn man von e_1 ausgeht und nur Ecken der Farben **1** oder **3** benützt, kommt man nie zu e_3 .
Dann kann man die Ecken der Farben **1** oder **3**, die man von e_1 aus erreichen kann, umfärben (aus **1** wird **3**, aus **3** wird **1**). Diese neue Färbung von G^* hat die Eigenschaft, daß bei den Ecken e_1, \dots, e_5 nur die Farben **2, 3, 4, 5** vorkommen. Also kann e^* mit der Farbe **1** gefärbt werden.



Beweis des Fünffarbensatzes (IV)

Schlechter Fall: Es gibt einen Weg von e_1 nach e_3 , der nur Ecken der Farben **1** und **3** benutzt.

Nun betrachten wir die Ecken e_2 und e_4 . Wegen der Planarität von G können diese Ecken nicht durch einen Weg verbunden sein, der nur Ecken der Farben **2** und **4** benutzt. Also kann man alle Ecken der Farben **2** oder **4**, die von e_2 aus erreichbar sind, umfärben (**2** \leftrightarrow **4** vertauschen). Damit erhält man eine Färbung von G^* , bei der e_2 die Farbe **4** erhält. Nun kann man e^* mit der Farbe **2** färben.

Damit ist der Fünffarbensatz bewiesen!